

Docteur Agnès Balastre

Orthodontie de l'enfant

36 rue Pierre Brossolette

28000 Chartres

Tél. : 02 37 34 00 58

Email : docteurbalastre@wanadoo.fr



Je m'informe

LES LIP-BUMPERS

Ce document, volontairement succinct, ne comporte que des notions d'ordre général et vient en complément des informations individuelles qui vous ont été communiquées en consultation. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles sur ce sujet.

À quoi servent les Lip-Bumpers ?

Lorsque tes molaires de lait tombent, elles sont remplacées par des prémolaires définitives qui sont plus petites. Toutefois, il est important de conserver l'espace créé car de nouvelles molaires définitives vont pousser. Les lip-bumpers permettent de maintenir cet espace.



Comment les Lip-Bumpers fonctionnent-ils ?

Les lip-bumpers utilisent la pression des lèvres et permettent de maintenir les molaires en arrière. Les lip-bumpers peuvent être portés sur la mâchoire du haut ou celle du bas selon le cas.

Pour quelle raison l'extraction de certaines dents de lait est-elle nécessaire ?

Souvent prescrites par l'orthodontiste, elles permettent :

- d'accélérer l'évolution des dents définitives
- de limiter les besoins d'extraction des dents définitives
- de faciliter le traitement multi-attaches et d'en réduire la durée.

Les extractions sont réalisées par votre chirurgien dentiste traitant.

Combien de temps dure ce traitement ?

La durée nécessaire de traitement est variable d'un patient à l'autre en fonction de :

- de la vitesse d'évolution des dents définitives.
- de la croissance.
- de la normalisation de la déglutition.
- du port de l'appareil.

MISE EN PLACE DES LIP-BUMPERS

Les boucles verticales situées sur les côtés, sont dirigées vers le bas pour le lip-bumper du bas et vers le haut pour le lip-bumper du haut. Les extrémités postérieures sont insérées dans les tubes des bagues molaires. La mise en place des lip-bumpers est un peu délicate au début et peut prendre du temps. Le retrait des lip-bumpers doit se faire délicatement en sortant un côté, puis l'autre, **jamais les deux en même temps !** Nous t'expliquerons les techniques de mise en place et de retrait de ton appareil.

CONSIGNES DE PORT

Les lip-bumpers doivent être portés 24 heures sur 24. Tu dois retirer ton appareil :
lorsque tu te brosses les dents
lors des repas (sauf les repas pris à l'école)
lors de la pratique de sports violents (risque de blessure ou de casse)
au ski, à la piscine ou lors des baignades (risque de perte).

Si tu ne portes pas ton appareil pendant quelques jours, une nouvelle période d'adaptation sera nécessaire. **Pour éviter ces désagréments, un port régulier est indispensable.**

CONSIGNES ALIMENTAIRES

Afin d'éviter le descellement des bagues molaires, il faut éviter de manger des **aliments trop durs ou collants** : chewing gum, caramels, nougats ...

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Sensibilité - Douleurs

- Les premiers jours de port, les lip-bumpers peuvent provoquer de légères blessures à l'intérieur des joues ou des lèvres. Si cela se produit, ne porte pas ton appareil pendant une demi-journée ou une journée, puis remets-le.

Si au-delà de 10 jours, les blessures persistent, contacte-nous pour prendre rendez-vous. Un réglage est sans doute nécessaire.

- Lorsque l'appareil est bien porté, il peut arriver qu'il vienne se plaquer contre la gencive après quelques semaines. Il ne faut pas t'inquiéter car c'est normal. Si le contact avec la gencive est douloureux, réduis la durée de port dans la journée et reprends rendez-vous au Cabinet.

Casse - Déformation de l'appareil

La casse d'un lip-bumper est exceptionnelle. Afin de prévenir une grosse déformation de l'appareil, il faut toujours le mettre dans sa boîte lorsqu'il n'est pas en bouche. Ne le mets jamais dans un mouchoir ou dans de l'essuie-tout, il risque d'être jeté à la poubelle. Un choc sur l'appareil, un retrait trop violent ou suivant un axe incorrect ainsi que le non respect des consignes alimentaires peut entraîner le descellement des bagues fixées sur les molaires. Si une bague molaire bouge, il faut téléphoner au Cabinet pour la refixer. Si l'appareil est déformé à la suite d'un coup, d'une manipulation trop brutale ou s'il devient difficile à mettre, évite de le porter et prends rendez-vous au Cabinet pour procéder au réglage.